

## Thema: Frühzeitige Fliegenbekämpfung im Kälberstall

Eine frühzeitige Bekämpfung der Fliegenlarven und der erwachsenen (adulten) Fliegen verhindert eine massenhafte Vermehrung im Stall. In der Praxis wird oft auf eine Bekämpfung der Larven und Eier verzichtet, da diese vom Tierhalter nicht wahrgenommen werden. Die Eier der Fliege werden unter dem Stroh versteckt abgelegt und entwickeln sich nach sieben Tagen zu einer erwachsenen Fliege. In der Folge explodiert die Fliegenpopulation, trotz Bekämpfung der adulten Fliegen.

Die Fliegen entwickeln sich in den Stallungen hauptsächlich in den feuchten Bereichen (z.B. unter den Tränkestationen) oder in den Randbereichen der Stallungen. Bei der Bekämpfung der Fliegenlarven ist darauf zu achten, dass die Larven regelmäßig alle 6 Wochen an diesen Stellen in der Einstreu (s. Foto) behandelt werden. Bei einer großen Fliegenproblematik ist eine komplette Behandlung der gesamten Einstreu notwendig.

Die **Fliegenlarven** bekämpft man in belegten oder unbelegten Ställen mit DESINTEC® CyroEx.

Die **erwachsenen Fliegen** bekämpft man mit DESINTEC® DitEx oder DESINTEC® NeoEx.



Weitere Informationen erhalten Sie unter 02 51/6 82-11 44 oder auf unserer Homepage [www.desintec.de](http://www.desintec.de).

**Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**