

Raiffeisen Obergrafschaft eG

informiert

13. Mai 2016

Fliegenbekämpfung

Wenn die Tage wieder wärmer werden, können sich sowohl Keime als auch Fliegen deutlich schneller vermehren und so zum Problem werden. Etwa 80 % der Fliegenpopulation sind als Eier, Larven oder Puppen nicht sichtbar.

In beiden Fällen gilt - und das ist bereits der halbe Erfolg: Bekämpfung rechtzeitig, um den Druck niedrig zu halten!

Weitere Informationen und Produkte erhalten Sie bei uns. Bitte sprechen Sie uns an.

Unkrautbekämpfung im Mais

Unsere Empfehlung zur Unkraut- und Hirsebekämpfung im Mais für das Jahr 2016 entnehmen Sie bitte der Beilage zu diesem Rundschreiben.

Winterweizen

Winterweizen befindet sich im Fahnenschieben, Frühsaaten haben das Fahnensblatt voll ausgebildet. Wenn der Fungizidschutz abgelaufen ist, sollte eine Anschlussbehandlung erfolgen.

Winterroggen

Winterroggen hat das Stadium Ährenschieben erreicht und zum Teil auch schon abgeschlossen. Abschlussbehandlung vornehmen!

Wintergerste

Die Ähren sind alle da, eine Abschlussspritzung kann jetzt erfolgen

Triticale

Vor allem Mehltau und Gelbrost sind mit steigender Tendenz zu finden. Wurde noch nicht behandelt oder liegt eine Gelbrostbetonte Vorbehandlung länger als zwei Wochen zurück, sollte unbedingt wegen des hohen Gelbrostdrucks eine Anschlußbehandlung mit 1,5 l Capalo gefahren werden.

Sommergetreide

Sommergetreide hat sich gut entwickelt. Bei der Sommergerste gilt es jetzt die Standfestigkeit abzusichern und die Unkrautbekämpfung durchzuführen.

→ **bei allen Getreidearten bitte Bestandskontrollen durchführen.**

Silofolien

Um unseren Foliendienst auch außerhalb unserer Geschäftszeiten in gewohnter Weise aufrecht erhalten zu können, bitten wir Sie, wenn Sie Folien benötigen, sich während der Geschäftszeiten telefonisch bei uns anzumelden, damit der Notdienst sich darauf einstellen kann, bzw. Termine mit den jeweiligen Landwirten zu bündeln.

Mit freundlichen Grüßen
Raiffeisen Obergrafschaft eG

Unkrautbekämpfung im Mais: Empfehlung 2016

Mischverunkrautung +
Hühnerhirse

Calaris + Dual Gold + Certrol B
1,0 l/ha + 1,0 l/ha + 0,25 l/ha


Mischverunkrautung +
Hühnerhirse +
Quecke

**1,0 l/ha + 1,0 l/ha Calaris + Dual Gold +
Certrol B 0,25 l/ha + 40 g/ha Cato**

oder

Ebenfalls ist Ampfer
gut bekämpfbar!

**1,0 l/ha + 1,0 l/ha Calaris + Dual Gold +
0,5 l (Nicosulfuron)***



**Sollte sich verstärkt Faden – Fingerhirse – Borstenhirse-
Quecke in den Beständen befinden, empfehlen wir:**

Mischverunkrautung + Hühnerhirse:

Laudis + Spectrum Gold 4,00 ltr./ha plus
Certrol B 0,25 ltr./ha

Mischverunkrautung + Hühnerhirse + Quecke:

Laudis + Spectrum Gold 4,00 ltr./ha plus
Certrol B 0,25 ltr./ha plus
Cato 40 g/ha

oder:

Laudis + Spectrum Gold 4,00 ltr./ha plus
(Nicosulfuron)* 0,5 ltr./ha

Bitte unbedingt beachten:

Bei Spritzbeginn muss die Pflanze trocken sein!!

Wichtiger Hinweis: *Nicosulfuron-Auflagen beachten!

(Nur alle zwei Jahre auf derselben Fläche anwenden)